

Mounjaro® – معلومات مهمة في لمحة مختصرة

استخدام دواء Mounjaro®

إدخال الحقنة



7

اختر موضع الحقن

- نظّف الجلد قبل الحقن، واترك هذا الموضع يجف قبل الحقن.
- يتم حقن دواء Mounjaro® أسفل الجلد (الحقن تحت الجلد) في منطقة البطن أو الفخذ. بدلاً من ذلك، يمكنك حقن دواء Mounjaro® في العضد. وقد تحتاج إلى المساعدة من أحد الأشخاص الآخرين إذا كنت تريد الحقن في العضد.
- عند الرغبة، يمكنك الحقن في نفس المنطقة من الجسم كل أسبوع. ومع ذلك، تأكد من اختيار موضع حقن مختلف في هذه المنطقة من الجسم.




8

احقن دواء Mounjaro®

- اضغط الجلد بحرص على بعضه بعضاً، واجعل هناك ثنية في الجلد في الموضع المراد الحقن فيه.
- احقن الدواء تحت الجلد كما هو موضح لك. احقن المحلول من الحقنة بالكامل للحصول على الجرعة الكاملة. يجب أن تبقى الإبرة في الجلد بعد الحقن لمدة 5 ثوان تقريباً للتأكد من الحصول على الجرعة الكاملة.
- اسحب الإبرة من الجلد.
- بذلك تكون أكملت تناول دواء Mounjaro®.


فتح الغطاء



4

أدخل الإبرة في القنينة.


- أدخل الإبرة عبر السدادة المطاطية لقنينة الدواء Mounjaro® واحقن الهواء في القنينة.



5

اسحب الجرعة من القنينة

- أدر قنينة دواء Mounjaro® والحقنة رأساً على عقب، واسحب كياس الحقنة ببطء لأسفل لسحب محلول دواء Mounjaro® بالكامل من القنينة. القنينة مملوءة بحيث يمكن سحب جرعة فردية من دواء Mounjaro® مقدارها 0,5 مل.
- إذا كانت هناك فقاعات هواء في الحقنة، فقم بالطرق عدة مرات على الحقنة بحرص لكي تصعد فقاعات الهواء إلى أعلى.




6

تُراعى المعايير الصحيحة

- اضغط على كياس الحقنة لأعلى بحرص حتى لا يكون هناك أي هواء في الحقنة، وحتى يصل كياس الحقنة إلى علامة 0,5 مل.
- اسحب الحقنة من سدادة القنينة.


التحضير



1

تحضير القنينة


- أزل الغطاء الواقي البلاستيكي من القنينة دون إزالة السدادة.
- نظّف السدادة على القنينة باستخدام ماسحة كحولية، وقم بتحضير حقنة جديدة.



2

ادمج كل من الإبرة والحقنة معاً

- اضبط موضع الإبرة بالأعلى على الحقنة، وأدر الإبرة حتى تصبح في موضع ثابت على الحقنة.
- لا تشارك الإبرة أو الحقنة مع شخص آخر أو تُعيد استخدامها.
- إذا كانت الإبرة والحقنة مدمجين بالفعل ، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.



3

تحضير الحقنة

- أزل واقية الإبرة من خلال سحبها بشكل مستقيم.
- حافظ على الحقنة مع الإبرة موجهين لأعلى.
- اسحب كمية صغيرة من الهواء في الحقنة، حتى يصل كياس الحقنة إلى حد 0,5 مل.

متى يتم الحقن؟

هل فاتتك جرعة؟

- في حالة نسيان إحدى الجرعات، يجب تناول هذه الجرعة في أقرب وقت ممكن خلال 4 أيام من وقت نسيانها.
- إذا انقضى أكثر من 4 أيام، فيجب تخطي الجرعة المنسية وتناول الجرعة التالية بشكل منتظم في اليوم المخطط له. وبأي حال من الأحوال، يمكنك بعد ذلك مواصلة تناول الدواء بانتظام مرة واحدة أسبوعيًا.

- احرص دائمًا على استخدام Mounjaro® في نفس اليوم من الأسبوع. وقد يساعدك ضبط تنذير في الهاتف أو التقويم لهذا اليوم.
- ويمكن تغيير يوم الجرعة الأسبوعية حسب اللزوم، طالما أن الفترة بين الجرعتين لا تقل عن 3 أيام.

التخزين

أين يتم التخزين؟

- احفظ الدواء في عبوته الأصلية لكي لا يتعرض محتواه للضوء.
- يمكن حفظ دواء Mounjaro® بدون تبريد لمدة تصل إلى 21 يومًا في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية. وبعد ذلك، يجب التخلص من القنينة.
- لا تُستخدم هذا الدواء إذا لاحظت تلف في القنينة أو الختم أو السدادة أو أن محلول الدواء متعكر أو لونه متغير أو يحتوي على جزيئات.

- احتفظ بهذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يُسمح باستخدام هذا الدواء بعد تاريخ "انتهاء الصلاحية" أو "الاستخدام قبل" أو "الصلاحية" المذكور على العبوة الكرتونية وملصق القنينة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- يُحفظ في الثلاجة (2 - 8 درجة مئوية). ممنوع التجميد. إذا تم تجميد القارورة، فلا تستخدمها.

التخلص من المنتج

مهم!


- بعد كل عملية حقن، تخلص من القنينة والإبرة والحقنة المستخدمة في حاوية مقاومة للثقب أو بحسب توجيهات الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي.

- احرص على قراءة معلومات الاستخدام المرفقة مع القنينة واتباعها.

يمكنك معرفة المزيد من هنا:

إلى فيديو الاستخدام

إلى الموقع الإلكتروني



- تحدّث مع فريقك الطبي في العيادة

- للمزيد من المعلومات، اقرأ معلومات الاستخدام المرفقة مع القنينة.

- تفضل بزيارة الموقع www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro أو امسح كود الاستجابة السريعة (QR) "إلى الموقع الإلكتروني" للحصول على المزيد من المعلومات حول دواء Mounjaro®.

- امسح كود الاستجابة السريعة "إلى فيديو الاستخدام" لمشاهدة فيديو الاستخدام.