

Wie oft wird Taltz® angewendet?

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt, an welchen Tagen Sie Taltz® anwenden müssen. Je nach Ihrer Diagnose finden Sie nachfolgend die entsprechende Dosierung.

Lagern Sie Ihr Taltz® gekühlt. Ungekühlt kann Taltz® bis zu 5 Tage bei einer Temperatur von maximal 30 °C gelagert werden.

Tipp: Nehmen Sie es 30 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank.

- Axiale Spondyloarthritis:**
oder
- Psoriasis-Arthritis mit leichter oder ohne Schuppenflechte:**
 - › **Startdosis:** 2 Injektionen (2 × 80 mg)
Datum der Startdosis:
 - › **Erhaltungsphase:** 1 Injektion (80 mg)
alle 4 Wochen
Datum der ersten Injektion:

- Psoriasis-Arthritis mit mittel- bis schwerer Schuppenflechte:**
 - › **Startdosis:** 2 Injektionen (2 × 80 mg)
Datum der Startdosis:
 - › **Induktionsphase:** 1 Injektion (80 mg)
alle 2 Wochen ab Woche 2 bis Woche 12
Datum der ersten Injektion:
 - › **Erhaltungsphase:** 1 Injektion (80 mg)
alle 4 Wochen ab Woche 12
Datum der ersten Injektion:

Liegen bei Ihnen weitere chronische Erkrankungen vor?

Welche:

Welche sonstigen Medikamente nehmen Sie ein?

Medikament(e):

.....

.....

TALTZ® PATIENTENPASS

Axiale Spondyloarthritis
und Psoriasis-Arthritis

Lilly
A MEDICINE COMPANY

Dieser Patientenpass gehört

Name

.....

Blutgruppe

.....

Mein Arzt (Tragen Sie hier die Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes ein)

Name

.....

Adresse

.....

Telefon/E-Mail

.....

Information für Patienten über Taltz® (Ixekizumab)

Dieser Patientenpass enthält wichtige Informationen, über die Sie vor und während der Taltz®-Behandlung Bescheid wissen sollten. Bitte lesen Sie ebenfalls die Gebrauchsinformation.

Tragen Sie diese Dokument mit sich und zeigen Sie es anderen Ärzten oder medizinischem Fachpersonal, von denen Sie behandelt werden.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Behandlung mit Taltz®.

Infektionen

Vor der Behandlung mit Taltz®

- › Bevor Sie die Behandlung beginnen, teilen Sie Ihrem Arzt mit, ob und welche anderen Medikamente Sie einnehmen.
- › Taltz® kann das Risiko, an einer Infektion zu erkranken, erhöhen. Sollten Sie an einer schweren Infektion oder an Tuberkulose leiden, weisen Sie Ihren behandelnden Arzt bitte darauf hin. Wenn Sie an einer schweren Infektion erkrankt sind, sollten Sie nicht mit Taltz® behandelt werden.

Während der Behandlung mit Taltz®

- › Wenn Sie vor kurzem geimpft wurden oder bei Ihnen eine Impfung vorgesehen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Bestimmte Arten von Impfstoffen dürfen Ihnen während der Behandlung mit Taltz nicht verabreicht werden.
- › Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, die auf eine Infektion hindeuten, wie zum Beispiel Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust oder Antriebslosigkeit, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Praxisstempel

Lilly A MEDICINE COMPANY