



Digitaler
Omvoh®-Therapiebegleiter
für Patient:innen

Lilly

IHR THERAPIEBEGLEITER IM ÜBERBLICK

 Anwendung und
Darreichungsform

 Behandlungsziele

 Mentales
Wohlbefinden

 Hilfestellungen

 Mögliche
Nebenwirkungen

 Behandlungs-
verlauf

WAS SIE ERWARTET:

Ihr Therapiebegleiter kommt in regelmäßigen Abständen passend zu Ihrem Therapieverlauf in Ihr E-Mail-Postfach.

Neben den Inhalten, die Sie direkt über Ihre E-Mail erhalten, bekommen Sie über weiterführende Links zusätzliche Informationen.

Wie läuft die Behandlung ab?

Die Behandlung besteht aus zwei Phasen:

1. Einleitungsphase



Ziel: Symptome verringern oder beheben

Die Einleitungsphase dauert insgesamt 12 Wochen. Alle vier Wochen findet eine Behandlungssitzung statt. Es gibt also insgesamt drei Behandlungen in dieser Phase. In dieser Phase erhalten Sie das Medikament als zwei separate Injektionen, die jeweils durch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt verabreicht wird. Das bedeutet, dass die Gabe über eine Venen in Ihrem Arm oder Ihrer Hand erfolgt.


2. Erhaltungsphase



Ziel: Nachhaltige Beseitigung der Entzündung

Die Erhaltungsphase schließt direkt an die 12-wöchige Einleitungsphase an. Da Colitis ulcerosa eine chronische, das heißt eine langfristige, Erkrankung ist, ist die Behandlung fortlaufend. Während der Erhaltungsphase erhalten Sie alle vier Wochen zwei Injektionen (Pflanzspritzen). Diese werden als subkutane Injektion bezeichnet, da sie unter die Haut gespritzt werden.

Ihr Behandlungsablauf:



Um den größten Behandlungserfolg zu erzielen, ist es wichtig, dass Ihr Medikament nach dem vorgesehenen Dosierungsschema verabreicht wird. Falls sich nicht direkt ein Erfolg einstellt, sollten Sie nicht verzweifeln. Ob und wie schnell und wie groß der Erfolg der Behandlung ausfällt, ist individuell unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin über Ihre Symptome.

Erfahren Sie mehr über Ihr Medikament

OMVOH®-BEHANDLUNGSVERFAHREN FÜR COLITIS ULCEROSA

OmvoH® (Mesalaminsulfat) ist ein Arzneimittel für Menschen mit Colitis ulcerosa. Wenn Sie eine Behandlung mit OmvoH® erhalten, gibt es dabei zwei Phasen. Sie beginnen mit der Einleitungsphase und gehen dann in die Erhaltungsphase über.



Das Hauptziel der Einleitungsphase ist es, ein Ansprechen auf das Medikament zu erreichen und Ihre Symptome zu verbessern oder zu beheben. Die Normalisierung der Schleimhäute und das Ausbleiben von Blut im Stuhl sind bei der Colitis ulcerosa als **symptomatische Remission** bezeichnet.

Die Erhaltungsphase beginnt in der Regel nach der 12-wöchigen Einleitungsphase und ist fortlaufend. Da die Colitis ulcerosa eine chronische (langfristige) Erkrankung ist, müssen Sie OmvoH® also möglicherweise über einen langen Zeitraum hinweg weiter erhalten. Das Hauptziel der Erhaltungsphase ist es, ein **Wiederbleiben** der Symptome zu verhindern. Wenn die Symptome doch wieder auftreten, spricht man von einem **Rückfall**.

Injektionen
Alle 4 Wochen
(Stark 12 wöchentlich)

Injektionen
Alle 4 Wochen
(Stark nach Woche 12)

EINLEITUNG

ERHALTUNG



Sie brauchen eine Langzeitbehandlung für Colitis ulcerosa, da es sich um eine chronische Krankheit handelt.

FAKTEN ÜBER COLITIS ULCEROSA

Colitis ulcerosa ist eine chronische (langfristige) Krankheit, die den Verdauungstrakt betrifft. In diesem Merkblatt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Was verursacht Colitis ulcerosa?

Die Ergebnisse sind noch nicht sicher, wie Colitis ulcerosa verursacht wird. Wir wissen, dass Colitis ulcerosa auftritt, wenn sich die normale Darmschleimhaut entzündet. Diese Entzündung kann auftreten, wenn das Immunsystem zu stark gegen die eigene Darmschleimhaut reagiert.

Colitis ulcerosa kommt in der Regel in der Formel vor. Es ist also möglich, die Wahrscheinlichkeit, an Colitis ulcerosa zu erkranken, ist größer, wenn Sie Verwandte haben, die auch daran leiden. Andere Risikofaktoren für das Auftreten der Erkrankung sind:

- Umweltfaktoren - Dinge, mit denen Sie in Kontakt kommen, wo Sie leben oder arbeiten
- Rauchen oder Ernährung
- Bestimmte Medikamente
- Name im Darm

DER MAGEN-DARM-TRAKT

1. Magen
2. Dickdarm (aufsteigender Dickdarm)
3. Dickdarm (gleichzeitiger Dickdarm)
4. Dickdarm (absteigender Dickdarm)
5. Dünndarm
6. Rektum
7. Anus



LEBEN MIT COLITIS ULCEROSA. WIR HÖREN ZU. WIR MÖCHTEN HELFEN.

- ✓ Nützliche und gut verständliche Informationen über die Behandlung und ihre Wirkung
- ✓ Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Anwendung des Medikaments
- ✓ Fürsorgliche und vertrauensvolle Unterstützung in jeder Phase der Therapie

**MÖCHTEN SIE MEHR
ERFAHREN?**



**HIER GEHT ES ZUR
ANMELDUNG:**

