

Wie oft wird Taltz® angewendet?

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt, an welchen Tagen Sie Taltz® anwenden müssen. Je nachdem, was Ihre genauen Krankheitssymptome sind, hat sich Ihr Arzt für eine der folgenden Dosierungen entschieden.

Tipp: Um keine Injektion zu vergessen, tragen Sie Ihre Taltz®-Tage in Ihren Kalender oder in Ihr Handy ein.

Wahlweise können Sie auch in der entsprechenden Tabelle Ihre Taltz®-Tage für die nächsten 14 Monate notieren.

Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte mit oder ohne Psoriasis-Arthritis:

- › **Startdosis:** 2 Injektionen (2 × 80 mg)
- › **Induktionsphase:** 1 Injektion (80 mg) alle 2 Wochen ab Woche 2 bis Woche 12
- › **Erhaltungsphase:** 1 Injektion (80 mg) alle 4 Wochen ab Woche 12

Datum der Startdosis (2 × 80 mg):

Induktionsphase von Woche 2–12: 1 Injektion alle 2 Wochen							
Erhaltungsphase ab Woche 12: 1 Injektion alle 4 Wochen							

Erwachsene mit Psoriasis-Arthritis mit einer leichten Schuppenflechte oder ohne Hautsymptome:

- › **Startdosis:** 2 Injektionen (2 × 80 mg)
- › **Erhaltungsphase:** 1 Injektion (80 mg) alle 4 Wochen

Datum der Startdosis (2 × 80 mg):

Erhaltungsphase: 1 Injektion alle 4 Wochen							

Welche sonstigen Medikamente nehmen Sie ein?

Medikament

Wie oft?

.....

.....

.....

.....

Ihr nächster Termin

Arzt

Termin

.....

.....

.....

.....

Haben Sie weitere Fragen, die im Taltz® Patientenpass nicht beantwortet werden?

Dann lesen Sie bitte auch die Gebrauchsinformation zu Taltz® oder wenden Sie sich an Ihren behandelnden Arzt.

Weitere Informationen, wie zum Beispiel ein Video zur Injektion von Taltz®, finden Sie auf:

www.taltz.de
Passwort: Haut

TALTZ®
PATIENTENPASS
Schuppenflechte & Psoriasis-Arthritis
im Erwachsenenalter



A MEDICINE COMPANY

Dieser Patientenpass gehört

Name

Mein Arzt (Tragen Sie hier die Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes ein)

Name

Adresse

Telefon/ E-Mail

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen zur Behandlung Ihrer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) und/oder Psoriasis-Arthritis Taltz® verschrieben.

Taltz® enthält als Wirkstoff Ixekizumab. Dieser kann die Aktivität eines Proteins namens IL-17A hemmen, das an der Entwicklung beider Erkrankungen beteiligt ist. Die Behandlung mit Taltz® kann Ihnen dabei helfen, die Symptome der Schuppenflechte und Psoriasis-Arthritis zu verringern.¹

Vor und während der Behandlung mit Taltz®

sind einige Dinge zu beachten. Dabei soll Sie dieser Patientenpass unterstützen. Tragen Sie Ihren Taltz® Patientenpass bei sich. Wir empfehlen, ihn zu allen Ärzten mitzunehmen, bei denen Sie in Behandlung sind.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Behandlung mit Taltz®.

¹ Taltz® Gebrauchsinformation; Dieser Patientenpass wurde im Januar 2021 auf Basis der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Taltz® Gebrauchsinformation erstellt. Bitte lesen Sie zusätzlich die Packungsbeilage von Taltz®.

Infektionen

Vor der Behandlung mit Taltz®

- › Bevor Sie die Behandlung beginnen, teilen Sie Ihrem Arzt mit, ob und welche anderen Medikamente Sie einnehmen.
- › Taltz® kann das Risiko, an einer Infektion zu erkranken, erhöhen. Sollten Sie an einer schweren oder wiederkehrenden Infektion oder an Tuberkulose leiden, weisen Sie Ihren behandelnden Arzt bitte darauf hin. Wenn Sie an einer schweren Infektion erkrankt sind, sollten Sie nicht mit Taltz® behandelt werden.

Während der Behandlung mit Taltz®

- › Wenn Sie eine Impfung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Während der Therapie mit Taltz® dürfen keine Impfungen verabreicht werden, die abgeschwächte Krankheitserreger beinhalten (Lebendimpfstoffe). Inaktivierte Impfstoffe hingegen können angewendet werden.
- › Wenn bei Ihnen Symptome auftreten, die auf eine Infektion hindeuten, wie zum Beispiel Fieber, anhaltender Husten, Gewichtsverlust oder Antriebslosigkeit, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Entzündliche Darmerkrankungen

Vor der Behandlung mit Taltz®

- › Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eine entzündliche Erkrankung des Darms namens Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa haben.

Während der Behandlung mit Taltz®

- › Beenden Sie die Anwendung von Taltz® und sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt oder suchen Sie medizinische Hilfe auf, wenn Sie Anzeichen von Darmproblemen bemerken, wie z.B. Bauchkrämpfe und -schmerzen, Durchfall, Gewichtsverlust oder Blut im Stuhl.

Praxisstempel


A MEDICINE COMPANY