SURMOUNT-5

Mounjaro®

överlägsen viktnedgång jämfört med Wegovy® (semaglutid)[1,a]

Mounjaro
(tirzepatid) injektionsvätska
A Lilly Medicine

Mounjaro, mer än GLP-1

GIP/GLP-1

Mounjaro är den första och enda GIP/GLP-1-agonisten. GIP verkar precis som GLP-1 i CNS och påverkar hunger- och mättnadskänslor, vilket leder till en minskad kroppsvikt. GIP-receptorer finns dessutom i fettvävnaden och påverkar fettinlagringen samt kan förbättra insulinkänsligheten.[2]

I **SURMOUNT-1** (72 veckor) visade Mounjaro en genomsnittlig viktnedgång på 22,5 %[b] och i **SURMOUNT-4** (88 veckor) visade Mounjaro en genomsnittlig viktnedgång på upp till 26 %[c,2]

Nu har data publicerats från direktjämförande studien **SURMOUNT-5**, som jämför effekten av **Mounjaro** och Wegovy (72 veckor).[1,a]

MOUNJARO VISAR I SURMOUNT-5[1]

- Överlägsen viktnedgång[a]
- Överlägsen minskning av midjemått[a]
- Likartad säkerhetsprofil som i tidigare studier[a]

[a] SURMOUNT-5: Högsta tolererbara dos av Mounjaro (15 mg eller 10 mg) jämfört med Wegovy (2,4 mg eller 1,7 mg), (p<0,001), hos vuxna med obesitas.[1]
[b] p<0,001 Mounjaro 15 mg jämfört med placebo.[2]
[c] Mounjaro i högsta tolererbara dos (15 mg eller 10 mg) har i SURMOUNT-4 visat en genomsnittlig viktnedgång på upp till 26 % (28 kg) från utgångsvärdet (vecka 0) till vecka 88, p<0,001 jämfört med placebo från randomisering (vecka 36) till vecka 88.[2]
[1] Den övergripande säkerhetsprofilen för Mounjaro och Wegovy i SURMOUNT-5 är likvärdiga dem i tidigare studier. De vanligaste rapporterade biverkningarna var från magtarmkanalen och var likvärdiga mellan Mounjaro och Wegovy.[1]

SURMOUNT-5[1]

Mounjaro ger överlägsen viktnedgång[1,a]

Mounjaro −21,6 % (−24 kg) viktförändring

VS

Wegovy −15,4 % (−17 kg) viktförändring

p<0,001

Genomsnittlig viktnedgång under 72 veckor[1]



[a] SURMOUNT-5: Högsta tolererbara dos av Mounjaro (15 mg eller 10 mg) jämfört med Wegovy (2,4 mg eller 1,7 mg), (p<0,001), hos vuxna med obesitas.[1]

SURMOUNT-5[1]

1 av 3 → **1 av 3 uppnådde ≥25 % viktnedgång** med **Mounjaro**, jämfört med 1 av 5 med Wegovy[1]

Andel patienter som uppnår viktreduktionsmål vecka 72[1,a]



[a] SURMOUNT-5: Högsta tolererbara dos av Mounjaro (15 mg eller 10 mg) jämfört med Wegovy (2,4 mg eller 1,7 mg), (p<0,001), hos vuxna med obesitas.[1]

SURMOUNT-5[1]

Överlägsen minskning av midjemått med **Mounjaro**[1,a]

Förändring av midjemått (cm)[1]



[a] SURMOUNT-5: Högsta tolererbara dos av Mounjaro (15 mg eller 10 mg) jämfört med Wegovy (2,4 mg eller 1,7 mg), (p<0,001), hos vuxna med obesitas.[1]

Likartad säkerhetsprofil[1,2]

Den övergripande säkerhetsprofilen för Mounjaro i SURMOUNT-5 är likvärdig dem i tidigare SURMOUNT-studier.

De vanligaste rapporterade biverkningarna var från magtarmkanalen och var likvärdiga mellan Mounjaro och Wegovy. I allmänhet var dessa lindriga till måttliga, ökade i samband med doshöjning och minskade med tiden.

Biverkningar som förekom hos ≥5 % i någon av behandlingsgrupperna[1]

	Mounjaro MTD (15 mg eller 10 mg) (n=374)	Wegovy MTD (2,4 mg eller 1,7 mg) (n=376)
Illamående	43,6 %	44,4 %
Förstopping	27,0 %	28,5 %
Diarré	23,5 %	23,4 %
Kräkningar	15,0 %	21,3 %
Covid-19	13,6 %	12,5 %
Trötthet	10,4 %	12,2 %
Flatulens och rapningar	9,9 %	7,7 %
Reaktioner vid injektionsstället	8,6 %	0,3 %
Övre luftvägsinfektion	8,6 %	11,4 %
Håravfall	8,3 %	6,1 %
Utspänd buk	7,2 %	6,4 %
Huvudvärk	7,2 %	7,2 %
Buksmärta	6,4 %	6,9 %
Yrsel	6,4 %	4,8 %
Gastroesofageal reflexsjukdom	6,1 %	10,6 %
Dyspepsi	5,9 %	7,4 %
Minskad aptit	4,5 %	5,1 %
Förkylning	4,5 %	6,1 %
Blåsbäreinflammation	2,9 %	5,6 %

GIP=glukosberoende insulinotropt polypeptid, GLP-1=glukagonliknande peptid-1; MTD=högsta tolererbara dos.

Referenser: 1. Aronne LJ, Bade Horn D, le Roux CW, et al. Tirzepatide as compared with semaglutide for the treatment of obesity. N Engl J Med 2025; Online ahead of print. doi: 10.1056/NEJMoa2416905. **2.** Mounjaro produktresumé.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Mounjaro® (tirzepatid), Diabetesmedel, övriga blodglukossänkande läkemedel, ATC-kod A10BX16 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld flerdos injektionspenna alternativt injektionsvätska, lösning i endos injektionsflaska.

Receptbelagt läkemedel (Rx), ej inom förmånen (EF)

Indikationer: Typ 2-diabetes: Mounjaro är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer eller som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Viktkontroll: Mounjaro är avsett som komplement till läkarbesök och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll, inklusive viktminskning och vikthantering, hos vuxna med ett initialt BMI på ≥ 30 kg/m2 (obesitas) eller ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m2 (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet (t.ex. hypertoni, dyslipidemi, obstruktiv sömnapné, kardiovaskulär sjukdom, prediabetes eller typ 2-diabetes).

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighet: Tirzepatid har inte studerats hos patienter med pankreatit i anamnesen och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Alla patienter bör informeras om symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit misstänks ska tirzepatid sättas ut och inte återinsättas om diagnosen bekräftas. Patienter som får tirzepatid i kombination med en insulinsekretagog eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Denna risk kan reduceras genom att sänka dosen av insulinsekretagogen eller insulin. Tirzepatid har förknippats med biverkningar i magtarmkanalen, som kan orsaka uttorkning, vilket kan leda till försämrad njurfunktion inklusive akut njursvikt. Patienter ska informeras om den potentiella risken för uttorkning och vidta förebyggande åtgärder för att undvika vätskebrist. Tirzepatid har inte studerats hos patienter med svår gastrointestinal sjukdom, inklusive svår gastropares, och ska användas med försiktighet till dessa patienter. Behandling av patienter med ventrikelstörning kan dock risken för aspiration i samband med generell anestesi och djup sedering. Tirzepatid har inte studerats hos patienter med icke-proliferativ diabetisk retinopati som kräver akut behandling, proliferativ diabetisk retinopati eller diabetisk makulaödem och ska användas med försiktighet och lämplig övervakning till dessa patienter.

Fertilitet, graviditet och amning: Tirzepatid ska inte användas under graviditet eller vid kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel. Tirzepatid ska undvikas minst en månad före planerad graviditet. Användning av tirzepatid i samband med amning rekommenderas inte.

Datum för översyn av produktresumén: 2026-09-01

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

Mounjaro är inte subventionerat

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00 www.lilly.com/se

Mounjaro tillhandahålls för nåvarande i styrkorna 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg och 10 mg.
Lilly arbetar för att tillhandahålla Mounjaro Kwikpen i doserna 12,5 mg och 15 mg så snart som möjligt.

Eli Lilly Sweden AB | Box 721, 169 27 Solna | 08-737 88 00 | www.lilly.com/se

© 2025 Eli Lilly and Company. All right reserved. Mounjaro®, KwikPen®
and Lilly are registered trademarks of Eli Lilly and Company.

PP-TR-SE-0143 | May 2025

Lilly
A MEDICINE FOR HUMANKINDOM