


Mounjaro[®] – Ważne informacje w skrócie

Stosowanie leku Mounjaro[®]

Przygotowanie



Przygotowanie fiolki

- Zdejmij plastikową nasadkę ochronną z fiolki, ale nie zdejmuj korka.
- Oczyszcz korek fiolki wacikiem nasączonym w alkoholu i przygotuj nową strzykawkę.




Założenie igły na strzykawkę

- Załóż igłę na górną część strzykawki i zakręć ją do oporu tak, aby była mocno przytwierdzona.

Nie udostępniaj nikomu ani nie używaj ponownie igły ani strzykawki.


Jeśli igła jest już założona na strzykawkę, można pominąć ten krok.



Przygotowanie strzykawki


- Pociągnij osłonę igły, aby ją zdjąć.
- Trzymaj strzykawkę z igłą skierowaną do góry.
- Pobierz niewielką ilość powietrza, cofając lekko tłok strzykawki do kreski wyznaczającej 0,5 ml.

Pobranie leku do strzykawki




Wprowadzenie igły do fiolki

- Wbij igłę w gumowy korek fiolki Mounjaro[®] i wstrzyknij powietrze do fiolki.



Pobranie odpowiedniej dawki z fiolki


- Odwróć strzykawkę i fiolkę Mounjaro[®] do góry dnem i powoli odciągnij tłok strzykawki w dół, aby pobrać cały roztwór leku Mounjaro[®] z fiolki. Fiolka została napełniona tak, aby można było pobrać pojedynczą dawkę 0,5 ml leku Mounjaro[®].
- Jeśli w strzykawce znajdują się pęcherzyki powietrza, delikatnie stuknij ją kilka razy, aby pęcherzyki uleciały ku górze.



Zwrócenie uwagi na prawidłowe dawkowanie


- Ostrożnie naciskaj tłok, aż w strzykawce nie będzie już powietrza, a tłok znajdzie się na poziomej kresce wyznaczającej 0,5 ml.
- Wyciągnij strzykawkę z korka fiolki.

Wstrzyknięcie



Wybór miejsca wstrzyknięcia

- Przed wstrzyknięciem oczyść skórę i poczekaj, aż wybrane miejsce wyschnie.
- Lek Mounjaro[®] wstrzykuje się pod skórę (wstrzyknięcie podskórne) brzucha lub uda. Alternatywnie możesz wstrzyknąć lek Mounjaro[®] w ramię. W przypadku wykonywania zastrzyku w ramię może być potrzebna pomoc drugiej osoby.
- Jeśli chcesz, możesz wykonywać wstrzyknięcia w ten sam obszar ciała co tydzień. Upewnij się tylko, że wybierasz inne miejsce wstrzyknięcia w ramach tego samego obszaru ciała.



Wstrzyknięcie leku Mounjaro[®]

- Delikatnie ściśnij skórę i przytrzymaj fałd skóry w miejscu, w którym chcesz wykonać wstrzyknięcie.
- Wykonaj wstrzyknięcie podskórne zgodnie z otrzymanym przeszkoleniem. Wstrzyknij cały roztwór ze strzykawki, aby przyjąć pełną dawkę. Igła powinna pozostać wtkuta w skórę przez co najmniej 5 sekund po wstrzyknięciu, aby została podana pełna dawka.
- Wyciągnij igłę z miejsca wkłucia.

Proces podania leku Mounjaro[®] został zakończony.

Zastosowanie

Kiedy wstrzykiwać?

- Lek Mounjaro® należy przyjmować zawsze tego samego dnia w tygodniu. Pomocne może być ustawienie przypomnienia na dany dzień w telefonie lub kalendarzu.
- W razie potrzeby można zmienić dzień cotygodniowego przyjmowania leku, o ile przerwa między dwiema dawkami wynosi co najmniej 3 dni.

Pominięta dawka?

- W przypadku pominięcia dawki należy ją jak najszybciej uzupełnić w ciągu 4 dni od takiego zdarzenia.
- Jeśli minęły więcej niż 4 dni, należy pominąć tę dawkę i podać następną dawkę zgodnie z regularnym harmonogramem przyjmowania leku. W każdym wypadku można następnie kontynuować regularne podawanie preparatu 1x w tygodniu.

Przechowywanie

Gdzie przechowywać?

- Produkt leczniczy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno stosować tego produktu leczniczego po upływie jego terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zbiorczym i etykiecie fiolki (EXP). Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego miesiąca.
- Przechowywać w lodówce (2°C–8°C). Nie zamrażać. **NIE WOLNO STOSOWAĆ** leku, jeśli fiolka była zamrożona.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby chronić zawartość przed działaniem promieni słonecznych.
- Lek Mounjaro® może być przechowywany poza lodówką do 21 dni w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Po upływie tego czasu fiolkę należy zutilizować.
- Nie stosuj tego produktu leczniczego, jeśli zauważysz, że fiolka, plomba lub korek są uszkodzone lub roztwór produktu leczniczego jest mętny, zmienił barwę lub zawiera cząstki.

Ważna informacja!

- Należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania fiolki i postępować zgodnie z nią.

Utylizacja

- Fiolkę, zużytą igłę i strzykawkę należy natychmiast po każdym wstrzyknięciu wyrzucić do pojemnika zabezpieczonego przed przekłuciem lub zutilizować zgodnie z zaleceniami lekarza, pracownika ochrony zdrowia lub farmaceuty.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

- **Zachęcamy do porozmawiania z zespołem diabetologicznym**
- Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania fiolki.
- Wejdź na stronę www.lilly-patient.de/de-de/mounjaro lub zeskanuj kod QR „Nasza witryna internetowa”, aby uzyskać więcej informacji na temat leku Mounjaro®.
- Zeskanuj kod QR „Film z instrukcją”, aby obejrzeć film z instrukcją stosowania leku.

Nasza witryna internetowa



Film z instrukcją



Niniejsza broszura jest przeznaczona dla osób, którym przepisano lek Mounjaro®.

1x w tygodniu
mounjaro[®]
Tirzepatid