

MOUNJARO^{MD} (TIRZÉPATIDE) :

PEUT MAINTENANT ÊTRE COMMANDÉ AU CANADA

Il est maintenant possible de commander Mounjaro au Canada. Mounjaro est offert sous forme de fiole à usage unique et à dose unique.

- > Les seringues, les aiguilles et les autres fournitures d'injection NE SONT PAS incluses et doivent être distribuées avec Mounjaro.
 - Les seringues distribuées doivent être munies d'une aiguille appropriée pour injection sous-cutanée, par exemple, une seringue à insuline de 0,5 mL munie d'une aiguille de 6 mm (calibre 31) ou de 8 mm (calibre 30).
- > Les fioles doivent être conservées au réfrigérateur à une température de 2 °C à 8 °C (ne pas congeler). Au besoin, Mounjaro peut être conservé hors du réfrigérateur, à des températures ne dépassant pas 30 °C, pendant une période maximale de 21 jours.

Aperçu de la posologie de Mounjaro

DÉBUT DU TRAITEMENT

 <p>2,5 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541041 CUP : 773007001591</p> <p>Dose initiale pendant 4 semaines (il ne s'agit pas d'une dose thérapeutique)</p>	 <p>5 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541068 CUP : 773007001614</p> <p>Pendant au moins 4 semaines</p>
---	--

Dans le cas des patients dont la glycémie doit faire l'objet d'une maîtrise accrue, vous pouvez augmenter la dose par paliers de 2,5 mg après au moins 4 semaines à la dose en cours d'utilisation¹.

Veillez consulter les instructions d'utilisation et la monographie du produit pour obtenir tous les renseignements sur la posologie et l'administration.

Pour commander Mounjaro, communiquez avec le distributeur de votre choix.

PLUS D'INFORMATION SERA DISPONIBLE SUR LE SITE MOUNJARO.CA*



PERSONNALISER

 <p>7,5 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541076 CUP : 773007001638</p> <p>Pendant au moins 4 semaines</p>	 <p>10 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541084 CUP : 773007001652</p> <p>Pendant au moins 4 semaines</p>	 <p>12,5 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541092 CUP : 773007001676</p> <p>Pendant au moins 4 semaines</p>	 <p>15 MG/0,5 ML PAR SEMAINE</p> <p>DIN : 02541106 CUP : 773007001690</p> <p>Dose maximale</p>
---	--	--	--

Mounjaro (tirzépate injectable) est indiqué comme traitement hebdomadaire d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2¹.

- En **monothérapie** lorsque la metformine ne convient pas en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.
- En **association avec** :
 - > la metformine ou
 - > la metformine et une sulfonylurée ou
 - > la metformine et un inhibiteur du cotransporteur rénal sodium-glucose de type 2 (iSGLT-2) ou
 - > une insuline basale, avec ou sans metformine.

Veillez consulter la monographie de produit à l'adresse <http://pi.lilly.com/ca/fr/mounjaro-ca-pm-fr.pdf> pour obtenir de plus amples renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'utilisation clinique qui n'ont pas été abordés dans cette annonce. Vous pouvez également obtenir la monographie en composant le 1-888-545-5972.

* Le grand public a désormais accès à la page d'accueil de Mounjaro.ca. Pour accéder aux renseignements destinés aux professionnels de la santé, vous devrez ouvrir une session.

Référence : 1. Monographie actuelle de Mounjaro. Eli Lilly Canada Inc.



PP-TR-CA-0069 10/2023. © 2023 Eli Lilly and Company. Tous droits réservés. Mounjaro^{MD} est une marque déposée détenue ou utilisée sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

