

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Retsevmo® 40 mg filmomhulde tabletten
Retsevmo® 80 mg filmomhulde tabletten
Retsevmo® 120 mg filmomhulde tabletten
Retsevmo® 160 mg filmomhulde tabletten
selpercatinib

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Deze bijsluiter is geschreven voor de persoon die de medicatie neemt. Geeft u dit middel aan uw kind? Vervang dan in de tekst “u” door “uw kind”.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Retsevmo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit middel in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Retsevmo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Retsevmo is een geneesmiddel tegen kanker dat de werkzame stof selpercatinib bevat.

Het wordt gebruikt voor de volgende soorten kanker, veroorzaakt door afwijkende veranderingen in het RET-gen en die zijn uitgezaaid en/of die niet met een operatie verwijderd kunnen worden:

- een vorm van longkanker, genaamd niet-kleincellig longkanker bij volwassenen die niet eerder behandeld zijn met een RET remmend medicijn.
- schildklierkanker (alle types) bij volwassenen en jongeren van 12 tot 18 jaar als het met behandeling met radioactief jodium, indien van toepassing, niet is gelukt om uw kanker onder controle te brengen.
- een zeldzame vorm van schildklierkanker, genaamd medullaire schildklierkanker, bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder.
- solide tumoren (kanker) in andere delen van het lichaam bij volwassenen, nadat het met eerdere behandelingen niet is gelukt om uw kanker onder controle te brengen.

Om er zeker van te zijn dat dit middel een geschikte behandeling voor u is, zal uw arts een test uitvoeren om te controleren of uw kanker zich kenmerkt door een verandering in het RET-gen.

Hoe werkt dit middel?

Bij patiënten met kanker veroorzaakt door een veranderd RET-gen zorgt de verandering in het gen ervoor dat er een abnormaal RET-eiwit wordt aangemaakt door het lichaam. Hierdoor kan ongecontroleerde celgroei en kanker ontstaan. Dit middel blokkeert de werking van dit abnormale

RET-eiwit en kan op deze wijze de groei van kanker vertragen of stoppen. Het kan ook helpen om de kanker te laten slinken.

Heeft u nog andere vragen over de werking van dit geneesmiddel of waarom u dit middel voorgeschreven heeft gekregen? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Als u ooit een ernstige vorm van huiduitslag of huidschilfering, blaren en/of mondzweren heeft gekregen na het innemen van dit middel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

- als u long- of ademhalingsproblemen heeft anders dan longkanker;
- als u een hoge bloeddruk heeft;
- als u is verteld dat u een afwijking heeft aan uw hart, die bekend staat als verlengd QT-interval, en die aangetoond is met behulp van een elektrocardiogram (ECG);
- als u problemen heeft met uw schildklier of schildklierhormoonspiegels;
- dit middel kan de vruchtbaarheid bij de vrouw en de man aantasten. Dit kan invloed hebben op uw vermogen om kinderen te krijgen. Bespreek dit met uw arts als dit u zorgen baart;
- als u in het recente verleden een ernstige bloeding heeft gehad.

Dit middel kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken zoals koorts, huiduitslag en pijn. Als u een van deze reacties krijgt, neem dan contact op met uw arts. Na controle van de verschijnselen kan het zijn dat uw arts u vraagt corticosteroiden in te nemen totdat uw verschijnselen verminderd zijn.

Een snelle afbraak van kankercellen (tumorlyssyndroom, TLS) kan optreden als u dit middel gebruikt. Dit kan een onregelmatige hartslag, nierfalen of abnormale resultaten van bloedtesten veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u in het verleden nierproblemen of een lage bloeddruk heeft gehad, omdat dit het risico op TLS kan verhogen.

Dit middel kan bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar beschadiging of een onregelmatige groei van het heupgewricht veroorzaken. Als u pijn in de heup of knie ervaart of zonder duidelijke reden mank loopt, neem dan contact op met uw arts.

Dit middel kan ernstige huidreacties veroorzaken. Stop met het gebruik van dit middel en zoek direct medische hulp als u klachten krijgt die verband houden met deze ernstige huidreacties zoals beschreven in rubriek 4.

Zie voor meer informatie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen” en neem contact op met uw arts als u verschijnselen heeft.

Wat controleert uw arts voor en tijdens de behandeling?

- Dit middel kan een ernstige, levensbedreigende of dodelijke ontsteking van de longen veroorzaken. Uw arts zal u vóór en tijdens de behandeling met dit middel controleren op klachten. Vertel het uw arts onmiddellijk als u klachten van longproblemen opmerkt, waaronder kortademigheid, hoesten en verhoogde temperatuur.
- Dit middel kan effect hebben op uw bloeddruk. Uw bloeddruk wordt gemeten vóór en tijdens de behandeling met dit middel.
- Dit middel kan invloed hebben op de werking van uw lever. Neem direct contact op met uw arts als u de volgende verschijnselen ontwikkelt die verband houden met leverproblemen: geelzucht

- (gele verkleuring van de huid en het oogwit), verminderde eetlust, misselijkheid of braken, of pijn aan de rechter bovenkant van uw maagstreek.
- Dit middel kan leiden tot afwijkingen in het ECG. Vóór en tijdens de behandeling met dit middel wordt er een ECG gemaakt. Vertel het uw arts als u bent flauwgevallen, aangezien dit een teken kan zijn van een afwijkend ECG.
 - Dit middel kan de werking van uw schildklier beïnvloeden. Uw arts zal uw schildklierfunctie controleren vóór en tijdens de behandeling met dit middel.
 - U krijgt vóór en tijdens de behandeling met dit middel regelmatig bloedtesten om uw leverfunctie en elektrolyten (zoals natrium, kalium, magnesium en calcium) in uw bloed te controleren.
 - Als u jonger dan 18 jaar bent, kan je arts tijdens de behandeling je groei controleren. Als u heup-, knie- of andere beenpijn heeft, laat het uw arts dan weten.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij patiënten jonger dan 18 jaar is dit middel niet bedoeld als behandeling van longkanker.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar is gebruik bij schildklierkanker (waaronder medullaire schildklierkanker) niet van toepassing.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Retsevmo nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt, vooral als u ook een van de volgende middelen gebruikt:

- geneesmiddelen die de concentratie van Retsevmo in het bloed kunnen verhogen:
 - o claritromycine (gebruikt voor de behandeling van bacteriële infecties)
 - o itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol (gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties)
 - o atazanavir, ritonavir, cobicistat (gebruikt voor de behandeling van HIV- infecties/AIDS)
- geneesmiddelen die het effect van Retsevmo kunnen verminderen:
 - o carbamazepine (gebruikt voor de behandeling van epilepsie, zenuwpijn, bipolaire stoornis)
 - o rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose (tbc) en sommige andere infecties)
 - o sint-janskruid (een kruid dat gebruikt wordt om een lichte depressie en angst te behandelen)
 - o omeprazol, lansoprazol of andere protonpompremmers (gebruikt voor de behandeling van zuurbranden, maagzweren en oprispingen van maagzuur). Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, dan moet u dit middel met een volledige maaltijd innemen.
 - o ranitidine, famotidine of andere H₂-blokkers die de productie van maagzuur verminderen en worden gebruikt voor de behandeling van maagzweren en oprispingen van maagzuur. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, dan moet u deze 2 uur na inname van dit middel innemen.
- geneesmiddelen waarvan de concentratie in het bloed kan worden verhoogd door Retsevmo:
 - o repaglinide (gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2 en controle van de bloedsuikerspiegel)
 - o dasabuvir (gebruikt voor de behandeling van hepatitis C)
 - o selexipag (gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie)
 - o digoxine (gebruikt voor de behandeling van hartaandoeningen)
 - o lovastatine en simvastatine (gebruikt voor de behandeling van hoog cholesterol)
 - o dabigatran (gebruikt voor het voorkomen en behandelen van bloedstolsels)
- geneesmiddelen die mogelijk minder goed werken wanneer ze samen met Retsevmo worden ingenomen:
 - o levothyroxine (gebruikt om een minder goed werkende schildklier [hypothyreoïdie] te behandelen)

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap omdat het onbekend is wat het effect van dit middel op het ongeboren kind is.

Borstvoeding

Geef geen borstvoeding aangezien dit middel schadelijk kan zijn voor een baby die borstvoeding krijgt. Het is niet bekend of dit middel overgaat in de moedermelk. U moet tot minstens 1 week nadat u de laatste dosis heeft ingenomen, geen borstvoeding geven.

Contraceptie

Aangezien dit geneesmiddel schadelijk kan zijn voor de baby, wordt aanbevolen dat vrouwen ervoor zorgen niet zwanger te raken en dat mannen vrouwen niet bevruchten. Als de mogelijkheid bestaat dat een persoon die dit geneesmiddel neemt zwanger wordt of iemand anders bevrucht, dan moet er gepaste anticonceptie worden gebruikt tijdens de behandeling en tot minstens 1 week na inname van de laatste dosis van dit middel.

Vruchtbaarheid

Dit middel kan de mogelijkheid om kinderen te krijgen beïnvloeden. Neem vóór de behandeling contact met uw arts op om advies te krijgen over het behoud van de vruchtbaarheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aangezien u zich tijdens het gebruik van dit middel slaperig of duizelig kunt voelen, moet u extra voorzichtig zijn als u een voertuig bestuurt of machines bedient.

Retsevmo bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe neemt u dit middel in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering

Uw arts zal de juiste dosering aan u voorschrijven. De maximaal aanbevolen dosering is:

- Lichaamsgewicht lager dan 50 kg: tweemaal daags 120 mg
- Lichaamsgewicht 50 kg of hoger: tweemaal daags 160 mg

Dit middel wordt twee keer per dag op ongeveer hetzelfde tijdstip ingenomen, bij voorkeur in de ochtend en avond.

Als u bepaalde bijwerkingen krijgt tijdens het gebruik van dit middel, dan kan het zijn dat uw arts de dosering tijdelijk verlaagt of de behandeling tijdelijk of permanent stopzet.

U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen. Neem de tablet in zijn geheel met water in en slik hem in zijn geheel door. Kauw de tablet niet, vermaal of splits de tablet niet voordat u deze doorslikt om er zeker van te zijn dat u de juiste dosis krijgt.

Als u moeite heeft om de grotere tabletten in hun geheel door te slikken, bespreek dan met uw arts of u meerdere kleinere tabletten kunt innemen om de voorgeschreven dosis te bereiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Heeft u te veel tabletten ingenomen, of heeft iemand anders uw geneesmiddel gebruikt, neem dan contact op met uw arts of het ziekenhuis voor advies. Het kan zijn dat er een medische behandeling nodig is.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u moet braken na het innemen van de dosis of als u een dosis vergeet, neem de gebruikelijke dosis dan in op het volgende tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis of uitgebraakte dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van dit middel, tenzij uw arts dit tegen u zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het gebruik van dit middel en zoek direct medische hulp als u een van de volgende klachten van ernstige huidreacties krijgt:

- Roodachtige, niet-verhoogde, schietschijfvormige of ronde plekken op de romp, vaak met centrale blaren, huidschilfering, zweren in de mond, keel, neus, geslachtsdelen en ogen. Deze ernstige huiduitslag kan worden voorafgegaan door koorts en griepachtige klachten [Stevens-Johnson-syndroom (SJS)].

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

- long- of ademhalingsproblemen, anders dan longkanker, met klachten zoals kortademigheid, hoesten en verhoogde temperatuur (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers);
- leverproblemen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers en worden in verband gebracht met afwijkingen uit bloedonderzoeken, zoals verhoogde leverenzymen), waaronder: geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht), donkere urine, verminderde eetlust, misselijkheid of braken, of pijn aan de rechter bovenkant van uw maagstreek;
- allergische reactie die gewoonlijk wordt gekenmerkt door koorts, spier- en gewrichtspijn, gevolgd door een huiduitslag (komt voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers);
- hoge bloeddruk (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers);
- bloedingen met verschijnselen als het ophoesten van bloed.

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als u een van de volgende bijwerkingen krijgt:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

- lage calciumspiegels in het bloed
- verminderd aantal witte bloedcellen (bijv. lymfocyten, neutrofielen, etc.)
- lage albuminespiegels in het bloed
- vocht vasthouden waardoor uw handen en enkels kunnen opzwellen (oedeem)
- diarree
- verhoogde creatininespiegels, aangetoond via een test; dit kan een teken zijn dat uw nieren niet goed werken (nieraandoeningen)
- (slepende) vermoeidheid
- droge mond
- lage natriumspiegels in het bloed
- verminderd aantal bloedplaatjes, wat bloedingen en/of blauwe plekken kan veroorzaken
- huiduitslag
- pijn in de buik

- verstopping (constipatie)
- lage hemoglobinespiegels, wat bloedarmoede kan veroorzaken
- lage magnesiumspiegels in het bloed
- misselijkheid (misselijk worden)
- hoofdpijn
- braken
- verschijnselen van een bloeding
- geen stijve penis krijgen bij seksuele opwinding (impotentie)
- verminderde eetlust
- afwijkend ECG
- lage kaliumspiegels in het bloed
- duizeligheid
- infectie van de urinewegen
- koorts of verhoging
- ontsteking van het slijmvlies van de mond
- minder goed werkende schildklier

Vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 100 gebruikers)

- lymfevocht kan zich ophopen in het slijmvlies van uw longen of uw buikholte, wat ademhalingsproblemen of vergroting van de buik kan veroorzaken
- beschadiging of onregelmatige groei van het heupgewricht die pijn of mank lopen veroorzaakt bij patiënten jonger dan 18 jaar

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blister en doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet als de binnenste verzegeling verbroken is of er tekenen zijn dat de verpakking gemanipuleerd is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is selpercatinib. Elke filmomhulde tablet bevat 40, 80, 120 of 160 mg selpercatinib.

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Tabletkern: microkristallijne cellulose, mannitol, natriumcroscarmellose, hydroxypropylcellulose,

natriumstearylumaraat

- Omhulling: polyvinylalcohol, titaniumdioxide (E171), macrogol, talk, rood ijzeroxide (E172) [alleen tabletten van 80 mg, 120 mg en 160 mg] en zwart ijzeroxide (E172) [alleen tabletten van 40 mg, 80 mg en 120 mg].

Hoe ziet Retsevmo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Retsevmo 40 mg wordt geleverd als een lichtgrijze, ronde tablet met aan de ene zijde "5340" ingeslagen en aan de andere zijde "Ret 40" ingeslagen.

Retsevmo 80 mg wordt geleverd als een donkerrood-paarse, ronde tablet met aan de ene zijde "6082" ingeslagen en aan de andere zijde "Ret 80" ingeslagen.

Retsevmo 120 mg wordt geleverd als een lichtpaarse, ronde tablet met aan de ene zijde "6120" ingeslagen en aan de andere zijde "Ret 120" ingeslagen.

Retsevmo 160 mg wordt geleverd als een lichtroze, ronde tablet met aan de ene zijde "5562" ingeslagen en aan de andere zijde "Ret 160" ingeslagen.

Dit middel is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 30, 56 of 60 filmomhulde tabletten van 40 mg, 80 mg, 120 mg en 160 mg.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eli Lilly Nederland B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, Nederland.

Fabrikant

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met uw lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2026.

Dit geneesmiddel is voorwaardelijk toegelaten. Dit betekent dat er in de toekomst meer definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel.

Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal deze bijsluiter worden aangepast.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: <https://www.ema.europa.eu>.